

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百九

十九

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣石鴻賓

謄錄監生臣張五誥

欽定四庫全書

普濟方卷二百九

明 周王朱橚 撰

泄痢門

濡泄

附論

夫內經曰濕勝則濡泄甲乙經曰寒客下焦傳為濡瀉
夫脾為五藏之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣而客於
脾則不能裨助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間
虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡泄

方

堅中丸 治脾胃受濕滑泄注下

黃連

去鬚

黃蘗

赤茯苓

去皮

白朮

澤瀉

各一兩

陳皮

人參

肉苳菹

白芍藥

半夏

桂

各半兩

右為細末水浸餗餅和丸如梧桐子大每服五七十丸食前溫米飲下

肉苳菹散

治腸胃受濕濡泄不止兼治暴瀉

肉苳菹

去殼

黃連

去鬚炒

訶梨勒

去核炮

甘草

炙

赤茯苓

苓

去黑皮

乾薑

炮

白朮

各半兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩

右為散每服二錢空心食前米飲調下日三

當歸散

治腸胃寒濕濡泄腹內痞刺疼痛

當歸

切

木香

乾薑

炮

肉苳蔻

去殼炮各半兩

訶梨勒

炮去

核

黃連

去鬚炒各三分

右為散先用水四盞入甘草生薑各一分黑豆半合並半生半炒同煎至二盞去滓分作二服每服用調散三錢空心日午服之

加味五苓散 治伏暑熱二氣及胃濕泄瀉注下或煩

渴小便不利

赤茯苓

去皮

澤瀉

木猪苓

去皮

肉桂

不見火

白朮

各一兩

車前子

半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓溫服不拘時或進來復丹亦可

炙肝散 治飲食生冷內受風寒泄瀉無度

川麴乾薑

炮半兩

大附子

炮半兩

縮砂仁

半兩

肉苳蔻

二箇

小茴香

四錢炒

川小椒

四兩

右為末每三四錢用白羊肝三二兩或獐猪肝或猪
羊腰子批開放藥在內鹽末一錢葱白二根同肝一
處紙裹潤濕燒香熟為度細嚼生薑湯下或米湯酒
送下食前空心服之

阿梨勒散

治寒溫傷脾濡瀉

阿梨勒

炮去核

吳茱萸

湯浸焙炒

木香

蕪荑

各半兩

黃連

去鬚炒

一兩

右為細散每服二錢空心米飲調下

白荳蔻湯

出聖濟
總錄

治腸胃虛濕濡瀉無度腸痛飲食

不化

白荳蔻

去皮

訶梨勒

炮去核

乾薑

炮

陳橘皮

湯浸去白
焙炒各半

兩

厚朴

生薑汁
炙三分

右搗篩每服五錢切薤白三寸水一盞半煎七分去

滓空心溫服日午再服

枳殼湯

出聖濟
總錄

治濡泄暴下不止

甘草炙 阿膠炙 燥各半兩 黃連去鬚 微炒 枳殼去穰 炒 厚朴

去粗皮生薑
汁炙秤一兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓空心溫服

日再

桂附丸

出聖濟總錄

治濡泄水痢久不止

桂去粗皮 附子

炮裂去皮臍

乾薑炮

赤石脂

各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心日午

米飲下日三

附子湯

出聖濟
總錄

治腸胃寒濕濡瀉不止及冷痢色白

食不消化

附子

炮裂去
皮臍

甘草

炙

阿膠

炙燥各
半兩

黃連

三分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞空心

溫服日再一名甘草湯

白朮丸

出聖濟
總錄

治脾胃受濕濡瀉不止健脾

白朮

乾薑

炮各
三分

人參

三分

厚朴

去粗皮生薑
汁炙一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九空心米飲下

日再

荳蔻散

出宣明論

治脾胃受濕濡泄不止而腸痛滑利

肉荳蔻

去殼炮五枚

甘草

炙剉一兩

厚朴

去粗皮薑汁炙一兩半

右為散每服二錢米飲下或湯調下食前溫服

猪苓丸

出聖濟總錄

治腸胃寒濕濡泄無度嗜困不食

猪苓

去黑皮半兩

肉荳蔻

去殼炮二枚

黃蘗

去粗皮炙一兩

右為末米飲丸菴豆大每服十九食前熟水下

附子丸

出聖濟總錄

治濡泄不止或冷痢無度

附子

炮裂去皮臍去

高良薑

各一兩

甘草

炙剉一分

右為末陳米煮糊丸如桐子大每服二十九米飲下

不拘時候

樗根丸

出聖濟總錄

治濡瀉裏急後重數走圜

樗根皮

剉一兩

甘草

炙剉一兩

枳殼

去穰麩炒半兩

右為散每服二錢粥飲調下食前一服止

戊己丸

出聖濟生方

治脾胃不定濕熱乘之泄瀉不止米穀

腸鳴腹痛

方見本門諸瀉類

對金飲子

出濟生
拔萃方

治瀉泄

平胃散

五錢

五苓散

二錢半

草薢

麤暴煨
熟半兩

右相和勻作四服生薑三片棗二枚水煮

白朮芍藥湯

出保
命集

治太陰脾經受濕水泄注下體重

微滿困弱無力不欲飲食暴泄無數水穀不化宜此
和之

白朮 芍藥

各一兩

甘草

五錢

右剉每服一兩水二盞煎至一盞溫服清如痛甚者

宜蒼朮

芍藥湯

蒼朮芍藥湯

出保命集

蒼朮

一兩

芍藥

一兩

黃芩

半兩

右剉每服一兩加淡味桂半錢水一盞半煎一盞溫

服清如脉弦頭微痛者宜蒼朮防風湯

蒼朮防風湯

出保命集

蒼朮

防風

各二兩

右剉同煎服如下血者宜

蒼朮地榆湯

出保命集

蒼朮

二兩

地榆

一兩

右判同前煎服

已上証如心下痞每服各加枳實一錢如茯苓加
二錢由小便不利用如腹痛漸已瀉下微少宜訶子
散止之法云大勢已去而宜止之

附子丸

出聖濟總錄

治寒濕濡泄久不瘥

附子

一兩炮裂去皮臍

甘草

炙判二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心生薑湯下日再

厚朴湯

一名黃連丸
出聖濟總錄

治傷濕濡泄不定亦治水穀痢

久不瘥

吳茱萸

湯洗三五
遍一分

赤芍藥

半兩

肉苳蔻

四枚
去殼

檳榔

四枚

枚

右搗羅為散每服三錢用不經水猪肝四兩去筋膜批為薄片重摻藥置一鼎中入漿水一椀醃半合蓋

覆煮肝熟入鹽秤用一錢葱白三莖細切生薑彈子
許拍破同煮水欲盡空心為一服如服令食之初微
瀉不效此是逐下冷氣少時自止渴即以粥湯飲之
一方為丸桐子大每服十九粥飲下一方用破故紙
即補骨脂

猪肚丸

出危氏方

治臟寒泄瀉先用製成厚朴附子二味

生薑棗煎服空心仍服此猪肚丸

川烏

炮

附子

炮各二兩

乾薑

炮

白朮

厚朴

各一兩半

良薑

炒肉苳菹

煨草撥

禹餘糧

火煨
醋汁

丁香

碯砂仁

桂心

各一
兩

右為末用獾猪肝一隻淨洗以川椒一兩去目茴香
一兩大麴二兩入猪肝內用線縫定酒醋煮爛取出
川椒茴香大麴焙乾為末均和煎藥以猪肚杵和得
所為丸梧桐子大每服五十丸空心米飲下

人參湯 療中焦虛寒洞泄補虛

人參

三兩

甘草

三兩

黃芩

二兩

當歸

三兩

茯苓

四兩

芎藭

三兩

厚

朴

四兩炙

乾薑

四兩炙

粟米

二升

右切以水一斗五升煮米取熟去米澄取七升下諸藥煎取三升分三服忌海藻菘菜大酢等物

訶梨勒丸

出和劑方

治腸胃虛冷內受風冷水穀不化泄

瀉注下腹痛腸鳴胸滿氣短又治腸胃積寒及冷純白或有青黑日夜無度及脾胃傷冷暴瀉手足逆冷脉欲絕並宜服之

訶梨勒皮

川烏頭

炮去皮臍

碓砂仁

白礬

煨各四兩

木香

肉苳蔻

炮 去皮

乾薑

炮 各二
十兩

龍骨

洗

赤石脂

各八
十兩

右為末用粟米飲為丸梧桐子大每服二十九至三十丸溫粟飲下食前服甚者加倍丸數一方有附子無砂仁

木香散

出和
劑方

治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下米穀

不化臍下痞痛腹中雷鳴胸膈痞悶脇肋虛脹及積寒久痢腸滑不禁肢體羸困不進飲食

木香

當歸

去蘆
細焙

肉苳蔻仁

炮

甘草

丁香

各二
十兩

赤石脂

十兩

附子

去皮臍醋煮切作
片子焙乾十兩

藿香葉

先焙四
十兩

訶梨子皮

十五
兩

右為末每服一大錢水一盞半生薑三片棗一箇煎

六分空心溫服

木香訶梨勒丸

出聖濟
總錄

治洞泄大腸切痛腸鳴不化食

訶梨勒

煨生核
三分

木香

半生半炒
共二兩

白朮

桂

去粗
皮

蕪

萸

炒各一
兩半

附子

炮裂去
皮臍

厚朴

去粗皮生薑汁
炙焦各二兩

良薑

炒一兩

甘草

炙劉半兩

乾薑

炮一分

肉苳蔻

去殼一兩

右為末陳麴末煮糊為丸梧桐子大每服三十九煨

生薑鹽湯下

肉苳蔻

出聖濟總錄

治脾胃虛寒洞泄注下腹脹腸鳴

肉苳蔻

五枚去殼

木香

一分分

蝎稍

炒一錢

橘皮

去白炒

乾薑

炮

附子

炮裂去皮臍去

胡椒

各半兩

右為末麴丸豌豆大每服十五丸米飲下

黃連飲

出聖濟總錄

治脾寒洞泄

黃連

去鬚炒

訶梨勒

煨去核

地榆

芍藥

炒各半兩

木香

當歸

切焙各三分

甘草

炙二分

右細剉每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服日

三

七棗湯

出和劑方

治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀

不化腹脇脹滿臍腹疼痛心下氣逆腹中虛鳴嘔吐

惡心胸膈痞悶困倦少力不思飲食

茴香

去皮炒

川烏

炮去皮臍

縮砂

取仁各八兩

益智

去皮一斤

乾薑

炮四
厚朴
去粗皮薑
製一斤

右為粗末每服五錢水一盞大棗七枚同煎七分去滓溫服空心食前

豆附丸

一名桂香丸
出和劑方

治男婦腸胃虛弱內受風冷水

穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴手足逆冷服諸藥不効亦治臟腑虛為風濕寒所搏冷滑注下不禁老人虛人危篤服之

肉苳蓯

炮

白茯苓

焙

附子

炮去皮
各四兩

木香

不見火

乾薑

炮

肉桂

去粗皮
各二兩

丁香

不見火
一兩

右為細末薑汁麵糊丸梧桐子大每服五十九至一百丸用薑湯下粥飲亦得空心食前一方或加訶子半兩一方不用木香

茱萸斷下丸

出危氏方

治臟腑寒腹痛泄瀉不止甚效

艾葉

炒

赤石脂

川薑

各半兩

吳茱萸

二兩半炒

縮砂仁

肉苳蔻

附子

炮去皮臍
各一分

右為末麵糊丸梧桐子大每服五七十九米飲食前

下昔趙通判名從簡甲辰年丁母憂食素之久苦瀉
日七行首尾幾年每服他藥不過三兩日復作後得
此方而愈又數年間遇瀉服之再効

二黃丸

出聖濟
總錄

治洞泄寒中

黃連

去
炒

黃蘗

去
炙

附子

炮
皮

烏梅肉

炒

乾薑

炮各
半兩

甘草

炙
一分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九至五十九空
心米飲下

固腸散

出直指方

治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀

不分冷熱不調下痢膿血赤少白多或如魚腦腸滑腹痛遍數頻併心腹脹滿食減少力並宜服之

陳米

炒二兩

木香

不見火一兩

肉苳蔻

生用

罌粟殼

去蒂蓋蜜炙二

兩乾薑

炮

甘草

炙各二兩半

右為細末每服二錢酒一盞生薑二片棗一枚煎至七分溫服不計時如不飲酒水煎亦得忌酒麵魚鮮等物

加味三建湯

出危氏方

治洞泄不止

大川烏

綿附

天雄

三味並炮鹽水浸去皮臍

木香

肉苳

薤

炮裂

訶子

去核各一兩

右剉散每服三錢生薑十片紅棗二枚鹽梅一箇陳米一撮同煎空心熱服未效仍服來復丹

溫中丸

出聖濟總錄

治脾胃虛寒洞泄不止四肢逆冷心

腹疼痛

肉苳薤仁

硫黃

研

乾薑

生用

附子

炮裂皮臍

龍骨

右為細末麵糊丸梧桐子大每服三十九食前艾葉

湯下

厚朴乾薑丸

出聖濟總錄

治脾胃虛冷洞泄不止

厚朴

去粗皮生薑汁炙三兩

乾薑

附子

炮去皮臍

白朮

各一兩

訶梨勒皮

三分

右為細末醋煮麵糊丸梧桐子大每服二十九至三十九空心食前熱米飲下日三

烏梅丸

出聖濟總錄

治大腸洞泄水穀入即注下

烏梅肉

炒四兩

附子

炮去皮臍

黃連

去鬚炒五兩

乾薑

炮二兩

肉

豈薹

去殼五枚

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九米飲下

黃連阿金湯

出千金方

治洞泄水穀注下亦治熱痢

黃連

去鬚阿膠

炙燥

烏梅肉

炒各二兩

山梔子仁

三十枚

黃蘗

去粗皮

判一兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分空心食前溫服

日二

附子丸

出聖濟
總錄

治洞泄寒中注下水穀或痢赤白食

入即出不消兼治膿血痢

附子

炮裂
皮臍

烏梅肉

炮乾各
一兩

乾薑

炮一
兩半

黃連

去鬚炒
二兩

右為末蜜煉丸梧桐子大每服五十九空心米飲下

日晚再服

如神散

出聖濟
總錄

治洞泄不拘冷熱注下不止

附子

炮去
皮臍

白朮

推碎用漿水煮半
日焙乾各一兩

甘草

炙

乾薑

炮
各

半兩

右為散每服一錢空心米飲調下如熱瀉新汲水調下

天仙子丸

出聖濟總錄

治大腸洞泄不止

天仙子

乾薑

炮

陳橘皮

湯浸去白焙各一兩

訶梨勒

一兩

右為粗末用醋拌勻一宿炒令黃色再為細末醋煮麵糊和丸桐子大每服二十九食前米飲下

紅豆散

一名玉粉散出衛生寶鑑方

治洞泄寒中注下不禁不思

飲食

紅豆

揀

乾薑

炮

硫黃

細研附子

大者炮去皮
脂各一兩

右為散每服一錢空心溫粥飲下再服當愈

荳蔻附子散

出聖濟
總錄

治脾胃久寒大腸虛滑洞泄

肉荳蔻仁

麵包
炮熟

附子

去皮臍
剉鹽炒

縮砂

去皮各
半兩

木香

半
分

右為散每服一錢食前米飲調下

丁香散

出王氏
博濟方

治脾胃冷洞泄

丁香

二錢厚朴

去粗皮生薑
汁炙半兩

檳榔

一枚
炮剉

肉荳蔻

去殼
二枚

麵包

右為末每服二錢熱粥飲調下一方粥飲煎三兩沸
溫服以少許清粥飲衝下

黃連當歸湯

出聖濟
總錄

治洞泄中水穀不化

黃連

去
鬚

當歸

切
焙

甘草

炙剉各
二兩

酸石榴皮

剉炒
四兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓空心食前

溫服

荳蔻湯

出聖濟
總錄

治洞泄不止

肉荳蔻

七枚
去殼

烏豆

白朮

各一
兩

右用油四兩先煎後三味後白朮黃色烏頭外裂裏

黃取出烏頭去皮臍入肉苴菹三味剉如麻豆每服

三錢水一盞煎八分去滓空心食前稍熱服

火輪散

出聖濟總錄

治脾胃氣寒大腸虛滑日夜不止

方見

本門冷

痢類

木香丸

出本草方

治氣冷下瀉

木香

半兩 川烏 一兩生

右為末醋糊丸桐子大陳皮湯下三五十丸

來復丹

出德生堂

治配類二氣均調陰陽奪天地沖和之

氣乃水火既濟之功可冷可熱可急可緩補損扶虛
善理榮衛養心腎上實下虛氣悶痰心腹疼冷臟腑
虛滑不拘男女老幼危急但有胃氣無不獲安

硫黃

用甘草熬水
酒潤細研

硝石

細研用厚朴水
酒潤各半兩

右和勻一處同淹少時用砂鉢於文武火上炒令交
搆氤氲相結取去埋土中去毒氣却碾為末用糯米
糊為丸如黃豆大每服三五十丸濃米湯空心服

治卒暴冷下下部疼痛

用燒磚令熱大酢沃之三重布覆坐上即瘥

附子湯

出聖濟總錄

治洞泄不止兼治霍亂

用附子一枚重七錢炮去皮臍細切分二服每服水

一盞鹽半錢煎至六分去滓溫服

建脾湯

一名建脾散
出聖濟總錄

治寒中洞泄不止及年高久瀉

方見諸瀉

痢於本門

洞泄方

出直指方

用車前子末米飲下

米附湯

出直指方

治洞泄

白朮

蒼朮

各二兩

芍藥

三兩

茯苓

四兩

附子

乾薑

各一

兩

右為粗末每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服

米附丸

出指南方

白朮

附子

各一兩

橘皮

二兩

右為粗末煉蜜丸梧桐子大每服三十九米飲下

薑附湯

出指
南方

治陰寒暴下

乾薑

三兩

附子

三分

甘草

一兩

右咬咀每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服

金液丹

出指
南方

用好硫黃一斤研用一甕瓶內盛令七分滿以瓦子蓋口通用鹽泥固濟日乾用磚砌作爐中心掘地安一罐子合口與瓶底相當滿盛水去口一指許坐藥瓶在上將熱炭火下在爐內蓋藥罐子可厚三五寸

每日用熟炭一斤簇著瓶却以熟炭連大蓋子更用磚蓋爐子如此七伏時撥去候打開色赤黃為上其滓石盡澄在下刮去細研為末以浸蒸餅丸如梧桐子大每服五十九至百九空心米飲下

白食不消者為寒不療方

出肘後方

黃連

一兩

甘草

炙

附子

炮

阿膠

炙各

半兩

右水三升煮一分為再服

附子赤石脂丸

出楊氏家藏方

治老人虛人腸胃虛寒洞泄

不禁

附子

炮去皮臍
取末一兩

赤石脂

研細
一兩

右件拌勻醋煮麵糊為丸梧桐子大每服五十九食

前溫米飲下

薑朴丸

出鮑
氏方

治中寒洞泄

乾薑

厚朴

等分

右為末蜜丸任下三十丸

朴附丸

出朱氏
集驗方

厚腸胃止寒泄助元氣進飲食兼治

脾腎氣弱手足浮腫

川椒

去目

茴香

各二兩

青鹽

一兩

附子

四兩

去皮生用切作片子

生厚

朴

生薑

各四兩

右用水三升於銀器內慢火煮水盡為度焙乾為末

煮糊為丸

蒜煮壯脾丸

出朱氏集驗方

厚朴

蒼朮

白茯苓

各二兩

陳皮

七錢

甘草

二錢半

訶

子

一兩附子

川烏

各一兩

生薑

半斤

棗子

五十枚

大蒜

十箇

去皮

煮爛

右細末神麴和丸每服百十九空心米飲鹽湯任下

諸痢 附論

夫一切痢者謂痢無定或米穀或膿或血或青或黃或赤或白變雜無常或雜色相兼而痢也夾熱則黃赤熱甚則變膿血也冷則白冷甚則青黑皆由飲食不節冷熱不調胃氣虛弱故變色也 治痢要訣痢出於積滯積物積也滯氣滯也物積欲出氣滯而不與之出所以

下墜裏急乍起乍止日夜凡百餘度病家所請莫不求其止孰知物積氣滯有如是之証耶世人但見有上項証候不論色之赤白脉之大小一皆通利行之物即用巴豆大黃葶氣滯用枳殼桔梗青皮蓬朮輩二者兼濟必能收功其間佐以黃連阿膠丸效驗尤著者蓋痢疾多因伏暑食熱酒麵炙燻醞釀而成其阿膠尤大腸之要藥有熱毒流滯則能疎導無熱毒流滯則能平胃市肆或無九子即以阿膠當歸青皮赤茯苓黃連作劑

入烏梅濃蜜同煎最能蕩滌惡穢積滯既去遍數自踈
嗣是却以木香茯苓硝砂白苳蔻陳皮甘草調之自然
喜食食則糟粕入於大腸然後真人養臟湯易簡斷下
湯可止

方

增損建脾丸

出千金方

治丈夫虛勞五臟六腑傷敗受冷

初作滯下久則變五色赤黑如爛腸極臭穢者羸瘦
身重胃冷飲食不消洩瀉不止

鍾乳粉

三兩

赤石脂

三兩

礬石

乾薑

茯苓

桂心

五味子

澤瀉

遠志

寄生

栢子仁

白

頭翁

人參

天雄

當歸

石斛

石榴皮

牡蠣

龍骨

甘草

各二兩

右為末蜜丸酒服二十九加至三四十丸此一方止

痢神効

水煮木香丸

出御藥
防方

治脾胃受濕臟腑滑瀉腹痛

日夜無度腸鳴水聲每欲利時裏急後重或下赤黃

或便膿血也並宜服之

木香

去積

丁香

訶子皮

當歸

藿香葉

黃連

生薑製
各一兩

厚朴

青皮

去白

白芍藥

陳皮

去白

甘草

炙

枳實

炒

乾薑

炮各半兩

乳香

肉苳蔻

砂仁

各一兩半

御

米穀

蜜水拌炒擇
黃色六兩

右為細末煉蜜丸彈子大每一丸水一大盞煎至七分和滓稍熱食前服

治痢仙方

詩曰八利臨終事可危仙方等分與君醫

三香止痛尤為妙四白和中不可虧甘枳更加罌粟
殼訶榆全藉石榴皮半夏厚朴黃連橘救苦端教在
片時

丁香 沉香 木香 白朮 白芷 白茯苓

白芍藥 甘草 枳殼 訶子 地榆 酸石榴

皮 半夏 厚朴 黃連 陳皮 罌粟殼

炙 蜜

右等分一錢作五服白加生薑煎赤加烏梅煎

諸痢患無新舊如藥療之躔瘥還發此即縱以新藥止

之終存其根本由腸胃中冷熱不調病根固結必須
湯藥滌之以洩病勢痢後更以藥物補助之有此候
者依後附子等六味湯以利之後服高良薑十味散
以補之

附子

炮

細辛

甘草

炙

人參

各二兩

乾薑

三兩

大黃

五兩

右切以水七升煮取二升四合去滓分三服溫服如
人行十里久一服此湯當得快利痢中有惡物如魚
腦狀或如棗李但異於常利勿怪之將息經三四日

宜合後高良薑等十味散之

高良薑 細辛 黃耆 白朮 苦參 丁香

各五兩

二兩 人參 乾薑 各四兩 豆蔻子 三兩 赤石脂 六兩

右藥為散以飲下之初服一方寸日再服之稍加至

二三忌生菜桃李雀肉等

神應散

出危氏方

治痢緊嚴絕妙

金罌草 梗 肉苳蔻 訶子 地榆 甘草 罌粟

殼 去蒂 當歸 去尾 茯苓 白朮 枳殼 去穢 烏梅 各一兩

丁皮

木香

住痛各五錢

陳皮

一兩取紅生血若紅痢不用

右為丸或末五色痢用春茶陳皮煎湯下如是末用

蜜一匙春茶烏梅煎服

加減木香煮散

出危氏方

治一切痢神效

木香

甘草

當歸

肉苳菹

人參

官桂

楊芍藥

訶子

烏梅

去核

阿膠

蚌粉炒

白茯苓

各五錢

罌粟殼

一兩半去蒂蜜炒

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚同

煎去滓空心服

大斷下丸 治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入脉細皮
寒氣少不能言有時發虛汗由脾胃虛耗耗則氣奪
由穀氣不入胃胃無主以養故形氣消索五臟之液
不收謂之五虛此為難治要能食者生及臟腑停寒
臍腹病痛

附子

炮

肉苳蓯

麵包

煨 牡蠣

煨 石

煨 細辛

去土蒂

七錢半

乾

薑

炮

白龍骨

研

赤石脂

研

酸石榴皮

醋煮乾為度

焙乾各一兩

半良薑

去蘆一兩半

白礬枯訶子

去核各一兩

右為末醋糊丸梧桐子大每服三十九粟米湯下一

方白湯下無白礬訶子

加減平胃散

白朮 厚朴

陳皮

各一兩

甘草

七錢

檳榔

木香

各一

兩半桃仁

黃連

人參

阿膠

白茯苓

各半兩

右為細末同平胃散煎服如血多加桃仁如熱泄加

黃連如小便澀加茯苓如氣不下後重加檳榔如膿

加阿膠如腹痛加芍藥甘草如濕多加白朮如脉洪
加大黃四時以胃氣為本久下血則脾胃虛損血不
流於四肢入於胃以致血痢

治痢如聖散 治一切痢疾無問久新或赤白或赤白
相雜日夜無度悉能治之紹熙壬子浙東提舉黃郎
中施此藥頗有效驗

當歸 地榆 縮砂仁 赤石脂 陳皮 甘草

乾薑 訶子肉 石榴皮 罌粟殼

各等分

右為麤末三錢重作一服水一盞入烏梅一箇煎至七分去滓赤痢冷服白痢熱服赤白痢溫服年高娠婦小兒皆可服忌生冷油膩物

斷痢湯 治胸心下伏水

半夏一升 生薑五兩 茯苓 甘草 龍骨各一兩 附子一兩

人參 黃連各三兩 大棗十二枚

右㕮咀以水八升煮取三升分三服

治諸痢及赤白痢不瘥羸瘦

用鼠尾草煮汁服亦末服粥飲調下一方赤下用赤
花白下用白花尤佳

治痢方

用生鷄子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取鷄子
白攤徧連紙日乾摺作四重包撮烏梅安熨斗中用
白炭火燒乘烟將盡時以碗蓋覆候冷研令極細入
水銀粉少許和勻如大人患分為二服小兒分為三
服不拘赤白痢空心并花水調服如覺臟腑微有踈

利更不要須再服

玄青丸 治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈諸藥不能
止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行
者宜以通之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水腫腹
脹兼治小兒驚疳積熱乳癖諸証唯洩瀉者勿服

黃連

去鬚

黃蘗

大黃

甘遂

芫花

醋拌炒

大戟

各半

兩牽牛

四兩取末二兩已上同細末

輕粉

二錢

青黛

一兩

右為末勻水丸小豆大初服十九後每服加十九空

腹日午臨卧三服以通利為度後常服十五二十九
數日後得食久病未瘥除者再加取痢痢後却常服
以意消息病去為度後隨証用之小兒丸如黍米大
或麻子大退疳驚熱積不瀕下者常服十九

昔一人
常用頗

能清利頭目寬膈美食使鬚鬚遲白久用亦能黑鬚
繫固牙齒使衰老氣革於面而手足陽明經絡貫注
之憂思則氣結而血液不行燥熱拂鬱而血衰不能
榮養故早蒼黃鬢白此藥能使陽明氣血宣通效

輕粉 粉霜 硃砂 雄黃 硃砂 信砒 巴

另研
雄黃研

豆

去皮各
一錢

黃丹

三錢
蠟三錢

右先研粉霜次旋入硃砂研細下雄黃硃砂信硃再
研下丹粉研勻別研已豆爛為油與前藥研勻近火
上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新
水下一丸小兒黍米大或止吐瀉痢疾調桂苓甘露
散或益元散亦得

秘方養臟湯 治五色痢經驗

陳皮

去白

枳殼

去穰

黃連

去鬚

南木香

烏梅

去核

各

五錢

粟殼

去蒂膜蜜炙一兩

厚朴

去粗皮薑汁炙

杏仁

去皮尖

甘草

各五錢

右剉散五色黑豆棗子煎紅痢生地黃春茶甘草節煎服五色久不效加龍骨赤石脂人參楊芍藥一兩為末蜜丸烏梅甘草湯下粟米飲亦可

乳香散 治痢疾重者數服止

人參 白朮 當歸 地榆 阿膠

各一兩

蚌粉

炒黃

甘草

各一錢

乳香

肉苳蔻

二箇麵裹

右剉散每服三錢以水一盞煎七分去滓溫服仍煎服來復丹

地榆散 治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血
赤多白少或因腸胃乘虛為熱毒所滲下痢純血臍
腹疼痛裏急後重口燥煩渴小便不利純下鮮血或
先經下痢不應服熱藥候服熱藥蘊毒不散積於腸
間滲而成血者並宜服之

地榆

炒

乾葛

各半斤

茯苓

去皮

赤茯苓

各六兩

乾薑

炮二兩

當歸

去苗三兩

甘草

炙四兩

罌粟殼

蜜炙十二兩

右為末每服二錢用溫熱水調下不拘時小兒三歲

可服半錢更量歲數加減與之若下痢純白或下紫
黑血腸滑不禁者不可服

黑虎丹 治痢疾不止者

用十二月殺的猪膽可收一百之上將雄黃豆裝入
膽內麝香少許陰乾看人大小每服五七粒為細末
如紅痢甘草湯下如白痢生薑湯下

獨神丸 治一切赤白痢不問新久百藥不效者

一名獨聖

九

用罌粟殼十兩分作三分一分生用去蒂萼及穰一分醋炒一分蜜炙為末用蜜丸小指頭大紅痢生地黃春茶煎湯嚼下白痢烏梅甘草節但為末二錢陳米鹽梅湯亦効一方薑煎一方用米醋一盞且炙且蘸候盡色黃為度焙乾研為末煉蜜丸彈子大每服一九水一盞入生薑如指面大一塊搥破煎八分通口服

樗白皮散 治下痢諸藥不效

用糯白皮一握粳米五十粒葱白一握甘草一二寸
豉二合水一升取半升頓服小兒量大小加減

陟釐丸 治百病下痢及傷寒身熱頭痛目赤四肢煩
疼不解協熱下痢或醫已吐下之腹內虛熱煩欲得
冷飲食不能消腹中急痛溫食則吐乍熱乍冷狀如
瘟疫或小便不利氣滿嘔逆下痢不止

水中陟釐五兩厚朴一兩漢中木防已六兩黃連三兩隴西

當歸四兩紫石英三兩三歲醇苦酒五升上好豉三升

右皆取真新者以苦酒二升清防已極令潤出之留
苦酒置以利刀切防已厚令一分使厚薄悉等以板
瓦覆着炭火上以厚紙藉瓦上布滿取防已以着紙
上訖從頭依次翻周而復始令色槁燥復投向餘苦
酒中更出着瓦上焙之如此盡苦酒止勿令火猛徐
徐焙冷極燥各搗下篩畢都合搗千杵以餘三升苦
酒漬豉一宿明旦以瓦盆盛之以一盆覆之蒸五升
土下須土氣通流熱出之於盆中研豉以新布絞取

濃汁如棗膏法以和藥搗三千杵頓為丸皆如水中
鷄頭子大分着數囊中懸令陰乾取燥乃更盛着函
以蠟密封其際勿令見風塵此藥三九為一劑平日
井花水服一劑晝服一劑暮服一劑皆水服之初服
寧少食當於未食前服藥若飲食消腹中調和者日
可一服若已瘥三二日可一服消息以意若病重藥
力未行者但益服之日可四五劑或時下不止者當
復更增令腹中有藥力飲食消是其效也新服藥未

安調當水飧助藥力心中了然後可作羹臠但當冷食之耳若有時不喜冷食者正是藥力盡耳復益服藥至一宿許則復欲盡冷也若欲不復藥者但稍溫食藥力自盡矣服藥不必強多飲水自隨體調耳久虛服之如法禁熱食生魚肉蒜生菜酒緣酒力發藥力令病者煩熱也又禁腥物及諸肥膩難消物皆莫食若有風病加防風一兩人虛可加石斛一兩若宿有下痢脾胃損弱者可加太一餘糧二兩半取石中

黃軟者若婦人產後疾加石硫黃二兩小便黃赤不利加蒲黃一兩依方消息之無不得效 胡治云舊

有五石赤石脂白石英鍾乳礬石并禹餘糧石各四兩常以二目合之泊宅編云姚祐自殿監遷入座母夫人病痢諸藥不效令李昂筮甄草有真人指靈草語之一日登對上訝其色悴具以寔奏詔賜一散子數服而愈久乃知椿莢子一味為末耳余檢本草椿莢主大便下血今處處有之夏中生莢樗之有花

者無莢有莢者無花常見生樗上未見椿有莢者然
世俗不辨椿樗之異故俗皆以此為椿莢其實樗莢
耳注云樗皮主再痢日華子云樗皮溫無毒止瀉及
脚風入藥時用蜜炙藥性論云樗白皮之性號微熱
無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不止下白利成血
後不行足

治大人丹痢

出本
草

用紅蜀葵葉搥汁服之可恐腹痛即煖飲之

白馬骨

草 出本

治水痢

以白馬骨莖葉煮汁服

主水痢不問冷熱

草 出本

取松楊皮濃煎令黑冷服一升瘥

治水痢

草 出本

方見本門冷痢類

止水痢後渴不止

草 出本

以赤瓜實汁服之

治水痢

草 出本

以葦草煮汁及生汁服之

澁腹止瀉

出本草

以橡斗子煮食之亦可止飢

主水痢

出本草

以櫟子生食之

九盞湯

出本草

主下痢不問冷熱赤白畧帶休息久下

悉主之

以黃連長三寸三十枚秤重一兩半龍骨如棊子四

枚重四分附子大者一枚薑一兩半並切先以水五合着銅器中去火三寸煎沸便下著土上沸止又添水五合如此九上九下內諸藥著火上沸轍下著土上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止

張仲景治痢紫參湯

出本草

用紫參半升甘草二兩以水五升內甘草煎取半升分溫作三服

斷下藥

以酸石榴皮須老木所結及陳久者微炙為末以燒粟米飯為丸梧桐子大食前熱米飲下三十至五十丸以知為度如寒滑加附子赤石脂各一倍

治下痢心胸滿腹不快腹中雷鳴或嘔吐

黃連

橘皮

甘草

各二兩

龍骨

生薑

半夏

各三

兩人參

大棗

十五枚

右㕮咀以水一斗先煮一大沸內藥煮取三升分四服並妊娠良

阿膠梅連丸

治下痢不問久新赤白青黑疼痛諸症

金井阿膠

淨草灰炒透明白別研不細者再炒研細

烏梅肉

去核炒

黃蘗

剉炒黃連

當歸

焙

赤芍藥

乾薑

炮

赤茯苓

各等分半

雨

右為末入阿膠研勻水丸桐子大溫米飲下十九食前夜五六服小兒如菴荳大忌油膩物

痢藥乳香散

白梅

一兩灰燒

棗子

一兩燒灰

瞿粟殼

一兩燒灰

訶子

半兩燒灰

右為細末每服一二錢水一小盞乳香黑豆大一塊
同煎七分不拘時溫服

治痢方

用蠟茶細末不拘多少白梅和丸赤甘草湯下白痢
烏梅湯下泄瀉不止陳米飲下每服二十九團茶尤
佳大凡痢疾不問赤白當先辨冷熱之異若手足和
暖則為陽當先服五苓散粟米飲調下次服感應丸
二十粒即愈若手足厥冷則為陰當服暖藥如已寒

丸附子之類如此治痢無不效有人夏月患痢一日
六七十行用五苓散立效

木香散 治痢疾腹痛

南木香

錢五

地榆

兩一

黃連

錢七

青皮

去穢

赤芍藥

枳殼

煨去穢

乳香

甘草

錢各五

右為末每服二錢熱湯調服

酸石榴皮散

治一切痢不問赤白或一日之間一二

百行一服便踈再二三服即愈

石榴皮 陳皮 甘草 川當歸 罌粟殼

去蒂 穰各

兩半

剉散用水十盞煎取三盞次用下藥

茯苓

七錢

粉草

七錢

北五味子

七箇作棗子

右為末將前藥汁入此三味再煎五七沸去滓空心服甚者不過兩劑輕者一劑立效

治痢如神

烏梅

七箇

楮實子

七箇

甘草

七寸

杏仁

七枚

米殼

七箇

雄黃豆

四十粒 棗 七 生薑 七 片

右咬咀水煎無時服之

治一切痢無效宜服此藥

巴豆

五七枚去皮心
研紙裹壓出油

桃仁

二十枚去雙仁湯
浸去皮尖麤炒黃

杏仁

二十枚去雙仁湯浸
去皮尖麤炒令黃

硃砂

一分

硫黃

一分

砒霜

麝香

半錢

右同研令細用軟飯和丸棗豆大每服以粥飲下三

九忌食熱物

遇仙立效散

治諸般惡痢或赤或白或濃淡相雜裏

急後重臍腹絞痛或下五色或如魚腦日夜無度或

噤口不食未問大人小兒虛弱老人產婦並宜服此

御米殼

去蒂蓋
炒黃

川當歸

洗

甘草

各二兩

赤芍藥

酸

石榴皮

地榆

關

右為粗散每服三錢水一盞半煎七分去滓空心溫
服小兒量歲數加減以瘥為度忌生冷油膩腥臊等
物一方赤茯苓北棗等分

黑豆散

小黑豆

炒

川楝子

烏梅

甘草

乾薑

罌粟

穀

三箇去
蒂穰

右剉散煎七分將紗濾過澄自然汁空腹服

治大人小兒痢疾

胡椒

甘草

米穀

葱白

乾棗

杏仁

竹

葉

七片

右咬咀水煎服之神效

又方 治暑毒濕氣下痢

右用雄黃一味乾蒸研為末甘草調服即效

如聖飲 治痢

檳榔

半兩

大附子

半兩

甘草

半兩

地榆

半兩

陳橘皮

二錢
去白

右為粗末每服半兩作一服水一盞半紫蘊莖舊者
一二寸煎至一盞空心食前熱服留滓再煎如瀉不
止必多服屢試皆效

救命延年男婦一切重痢

黃連

六兩

乾薑

川當歸

阿膠

各三兩

右為末米醋煮阿膠令消盡量藥多少令醋恰好不可剩將藥末搜醋丸梧桐子大每服二十九飯飲吞下

駐馬丸

主救命延年治男婦一切重痢

方見本門合痢類

消食止痢令人強健及服食未能斷穀者

以橡斗子啖之蓋橡斗子非果穀而最益人氣無氣而受氣無味而受味常服最有益

平補散 治痢後不止手足冷此藥補之溫脾正氣

白朮 甘草 白薑 陳皮 茯苓 木香

各二錢

各一

錢 肉苳蔻 三箇

煨

右為末食前空心乃可服鹽湯下一錢日三四服痢止手足溫食進却住服

金粟湯 治男婦室女小兒一切下痢不問新久冷熱不調日夜無度臍腹絞痛即痢肢體困倦小便閉澀不思飲食漸瘦又治傷生冷脾胃虛弱飲食不消腹

脹腸鳴泄瀉不止連月不瘥並宜服之

陳皮

去白一兩一分

車前子

炒四兩

乾薑

炮二兩

甘草

炒

瞿麥

殼

去穰蒂蜜炒各半斤

右為末每服二錢水一盞棗一箇薑二片煎七分空

心食前稍熱服或飯飲調下亦得忌生冷油膩魚鮓

醬等物

治痢疾

黃連

巴豆

去殼各二兩

右和炒赤色分揀各另研為末以菰豆打糊為丸粟米大作記認二處各自安頓巴豆末作一處為丸黃連末別作為丸白痢黃連丸二十粒米湯米泔下赤痢用巴豆丸二十粒井水下

黃連丸 療痢無問冷熱並主之

一名黃連阿膠丸
方見本門白痢類

犀角丸 但是痢服之無不瘥

犀角

屑取黑色文理
粗者產后稱佳

宣府黃連

金州黃蘗

赤色
緊薄

者苦參

多買
輕搗

川當歸

五物
取粉

右等分別搗搗了秤和為散空腹爛煮糯米飲和一錢服之日再忌粘滑生菜油膩

腸風黑散 治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之內或食生冷或啖炙煇或飲酒過度積熱腸間致使腸胃虛弱糟粕不聚大便鮮血臍腹疼痛裏急後重或肛門脫出或久患酒痢大便頻併並皆療之

敗稷

燒

木饅頭

燒

烏梅

去核

甘草

炙各二兩

右為細末每服二錢水一盞煎至一盞空心溫服

治痢

紫苑 桔梗 赤芍藥 白朮

已上各等分

右為細末每服三五錢細切羊肝拌之作麵角兒燒服之白湯送下

食前蒼朮芍藥湯 治痢疾痛甚者

蒼朮

一兩 芍藥

一兩 黃芩

桂

各五錢

右剉每服一兩水煎

訶子散 如腹痛漸已泄下微少宜止之

訶子皮

一兩生熟各半

木香

半兩黃連

三錢

甘草

炙各二錢

右為細末每服二錢以白朮芍藥湯調下如止之不
已乃內有餘邪訶子散內加厚朴一兩竭其邪氣也
若泄久不愈者多傳變為痢疾太陰傳至少陰是為
鬼邪先以厚朴枳實湯防其大變

黃連阿膠湯

治毒痢及腸蟲注下血如豚肝心煩腹

痛又脉或大或小浮熖而起下血如豚肝五內切痛
此或因服五石湯丸逼損氣甚則血自百脉經絡而

未注下甚蠱毒此為難治

阿膠

一兩
炒

黃連

二兩

黃栢

一兩
炒

梔子仁

半兩

右為粗末每服四錢用水一盞煎七分去滓服不拘

時

聖藥子

出醫方
集成

治一切下痢臍腹痛

木香

二錢
半

乳香

別研

沒藥

別研各
一錢

肉苳蔻

二枚
麵
裹煨

右為末每服一錢大乾棗一枚去核先入一半藥末

在內次用水浸已豆半粒再入藥末半錢合定用油

餅紙裹一指厚火煨麵熟為度去麵巴豆不用只細嚼棗藥空心米飲下一方用乳香一兩研肉苳蔻二兩煨作末陳米糊丸效

猪肝丸

出千金方

治下痢腸滑飲食及服藥俱完出者

猪肝

一斤乾乾

黃連 烏梅肉

阿膠

各二兩

胡粉

七棊子大

右為末蜜丸梧桐子大酒服二十九日三亦可為散

服方寸匕

郁子丸

出危氏方

治痢後風手足不能屈伸或麻痘証變

手足筋急亦能治之

郁李仁 枳殼 川獨活

鼈甲 醋炙黃

右等分為末木瓜湯調下

治一切痢有效

出聖惠方

寒水石

一分

附子

一分炮去皮為末

砒霜

一分

定粉

一分

右都研粉以水浸蒸餅和丸如黍米大每服三丸不拘時以新汲水下忌食熱物

又方

出聖惠方

硃砂

二兩

硫黃

一兩

砒霜

半兩

黃丹

一兩
微炒

右和細研如粉水浸蒸餅和丸桐子大每服以冷飲

下一丸忌食熱物

又方

出聖
惠方

巴豆

十枚
去皮
心出油

硫黃

三分

硃砂

三分

右為細末研如粉以麴糊和丸菴豆大每服以新汲水

下二丸忌食熱物

又方

出聖
惠方

白礬

一兩
燒灰

硃砂

半兩

麝香

半錢

右都研如粉糯米飯和丸如黃米大每服不計時以

二宜湯下十九

又方

出聖
惠方

巴豆

七枚
去皮
心出油

深色臘脂

二錢

右先研巴豆末次入臘脂同研令細煮棗肉和丸
黍米大每服以冷飲下三丸小兒一九忌食熱物

黃丸子

出醫方
大成

止諸痢

黃連

八兩

枳殼

四兩

大黃栢皮

四兩

右為末麴糊為丸空心飲湯下如裏急後重加枳殼湯

下

參附湯

出危氏方

人參

綿附

炮去皮臍

肉苳菟

微火煨裂

右剉散每服二錢水一盞半生薑七片棗二枚煎食

前服

治痢緊嚴絕妙

金櫻花葉及子

罌粟殼

去穰及蒂
萆醋炒

右為末用蜜九手指頭大五花痢用春茶陳皮煎湯
如痢用蜜一匙春茶烏梅煎湯服下

香茸丸

出危
氏方

治下痢危困氣血衰弱

麝香

半錢別研
臨時入

鹿茸

刮去皮毛
酥炙一兩

右鹿茸為末方入麝香以燈心煮棗肉為丸梧桐子
大每服五十九空心食前用米飲下若再添入乳香
半兩尤有效

楊梅方 和五臟能滌腸胃除熱潰氣切不可多食甚能損齒及筋亦能治痢用楊梅燒灰服之

獨聖丸 治痢

用川烏頭一箇好者柴灰火燒烟令盡放地上蓋子合良久細研用酒蠟丸大如麻子每服三丸亦痢用黃連甘草黑豆煎湯冷吞下如白用黑豆甘草煎湯放冷吞下如瀉及肚疼水吞下每於空心服之忌熱物

治癆痢及癥瘕甚効

用羊腎合脂為羹以蒜齏食脂一升甚驗

治下痢

用小麥炒粉一合和服斷

治痢藥

出百一
選方

用罌粟殼并去核鼠查子各數枚焙乾末來飲下治
噤口痢鼠查子即糖毬

百水散

出百一
選方

治一切痢不問赤白或一日之間一

二百行只一服便踈再三服即愈魏不伐方

罌粟殼

三斤去皮上下蒂頂隔剉成片子蜜炒令赤色淨秤

厚朴

三斤去粗皮淨炒用

生薑汁淹一宿炙令薑汁盡為度

右為細末每服二三錢米飲調下忌生冷油膩魚酥

毒物三日

三神丹

治痢疾

方見本門赤白痢類

濟泄丹

治痢疾

巴豆

七粒去殼膜

丁香

四十箇

胡椒

四十箇

右藥為末糯米和丸棗豈大每服一九赤米飲下白
薑湯下赤白薑飲湯送下男婦皆可小者小丸一方
各用一百三十三箇赤痢蜜湯下白痢砂糖湯下

痢疾藥

黃栢

一兩用
蜜炙透

巴豆

三錢不
去油

右為末滴水為丸梧子大每服三九赤甘草湯下白
薑湯下小兒一九心痛艾醋湯熱服氣噎薄荷湯下

治千百種雜下

出肘
後方

黃連

三

烏梅

四十
枚

卷二百九

右以水八升煮取四升停冷內鷄子白一枚攪調又煎取二升分為三服一方下痢熱諸治不瘥為未蜜丸桐子大每服二十九三夜

薑茶治痢法

出危
氏方

治赤白冷熱諸痢及暑毒食毒治

痢下腹痛肚皮熱手不可近

用老生薑切如豆許與茶葉等分用新水煎一服一方如白痢用蜜赤痢用薑末効服真人養臟湯再加

芍藥當歸立止若熱痢即留薑皮冷即去皮大炒薑
能助陽茶能助陰二者能調陰陽失宜

治痢

一名沙調散
出經驗良方

用臘茶不拘多少新舊細研如赤痢用蜜同水煎白
痢用連皮薑研自然汁同水煎每水一盞煎半盞空
心服二服即愈經驗方用臘茶二錢湯點七分傾一
蛤蜊生麻油在內攪勻空心服之須臾腹痛大下即
止予少年親服之作效

真方聖散子 治男婦脾胃受濕中脘停寒吃物頻傷

心胸滿悶脇肋膨脹腸鳴虛痞小腹堅痛臍下強急
或大便不調水穀遲化裏急後重下痢膿血或五色
或便如魚腦或如豆汁或有鮮血或如爛肉日夜無
度久不愈嗜卧怠惰虛瘦肢體沉重寒熱不時此藥
固養脾胃溫中止腹痛服之有效

御米穀

五兩搗碎
醋炙黃色

甘草

炙黃

赤石脂

烏魚骨

去肉皮

荳蔻

麵裹煨
去麩

揀丁香

訶子皮

乾薑

炮各
二兩

右為末每服先用水一盞入如乳香少許煎七分沸
調藥末二錢和滓食前熱服

治痢疾

用臘月雀兒割開腸肚去皮毛用去皮巴豆一箇放
在內入沙石罐內盛頓炭火燒作黑研細另用好酒
煮黃蠟百十沸將蠟取出磁盞內化開黃蠟却將雀
兒末一處為丸每服一二十丸不拘時候如紅痢甘
草湯下白痢乾薑湯下花紅痢甘草乾薑湯下

懷香子方 治瘴痢渾身熱連背項

用茴香子搗取汁服

治痢亦治瀉血

用芫荽子一合搗碎赤者用糖水調白者用生薑自然汁調水服一方酒調服

又方 用砂糖水作雜椒料等物將烏龜去殼爛煮食之以多為度即愈

交和散 治痢

用御米殼去隔蒂乾淨安排新瓦上炙焦黃為末次
入平胃散如赤則用御米殼末二錢白則用平胃散
二分次飲湯調下

治暑痢

用五苓散粳米煎湯送下消暑丸

治痢

用杜蒺藜炒為末酒調二三服

楮實方 治瘴痢無問老少日夜百餘度者

取乾楮葉三兩熬搗為末煎烏梅湯服方寸兼取羊
猪裏膜內穀道痢出即止

治疳痢方

取樗根搗絞汁一鷄子殼許和粟米泔一鷄子許服
以知為度即瘥甚驗如神小兒加減用之

治痢

用黃丹不拘多少熔黃蠟和劑為丸豌豆大每服三
九赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑

兼用之

一方治痢

東榆西柳樹南桃 塞北雲桑節節高

此是周公出行法 萬兩黃金也不消

治卒下痢多驗方

用韭葉煮鯽魚鮓食之

治暴痢方

用小鯉魚一枚燒為末米飲服之大人小兒俱服得

一方四兩去鱗紙裹火煨煮粥飲下

又方 用搗蒜兩足下貼之

治卒下痢湯方

方見本門
諸瀉類

普濟方卷二百九

欽定四庫全書

普濟方卷二百十

明周王朱橚撰

泄痢門

諸痢

真人養臟湯 治脾胃虛弱冷熱不調臟腑受寒下痢

赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹疼痛日夜

無度胸膈痞滿全不思食及脫肛酒毒便血

方見本門赤白

痢類

水煮木香丸

治純下白痢及淡紅黑痢

方見本門
諸瀉痢類

治一切痢

砒霜 黃丹

各等分

右同研細用黃蠟溶和藥末為膏旋丸如菉豆大每服三丸飯飲下小兒丸如粟米大亦飲下忌葷腥

治痢

因腸胃間有酒食生冷積滯而成即古方所謂滯下者用加巴感應九十餘粒白梅煎茶或薑湯嚥下如

小便少五心煩熱煎生料五苓散吞下先令大便利
去積滯却服斷下湯之類即愈

治痢

以罌粟古方未聞今人所用雖其法小異而皆有奇
功或用數顆慢火炙黃為末米飲下或去粟用殼如
上法或以殼五七枚甘草一寸半生半炙大碗水煎
取半碗溫溫呷服蜀人山叟但用殼并去核鼠杏子
各數枚焙乾為末飲下尤治噤口痢

厚朴枳實湯

出保
命集

厚朴

對一兩

枳實

對一兩

訶子

一兩半
生半熟

木香

半兩

黃連

二錢

甘草

炙二錢

大黃

三錢

右為末每服三五錢水一盞半煎一盞去滓溫服

太陽經動下痢為鶩溏大腸不能禁固卒然而下成小
泊光色其中或有硬物欲起而又下欲子而不水小便
多清此乃寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯

桂枝湯

出保
命集

桂 白朮

芍藥

各半兩

甘草

二錢

右剉每服半兩水一盞煎七分去滓溫服

白朮湯

出保命集

白朮

芍藥

各二錢

乾薑

半兩

甘草

二錢

右剉為粗末水煎服之甚則去乾薑加附子三錢

神效越桃散

治諸下痢之後小便利而腹中虛痛不

可忍者此謂陰陽交錯不和之甚也

大梔子

三錢

高良薑

三錢

右和勻服每三錢米飲或酒調下其痛立効

治瀉痢 治臟腑不和虛滑穀不化用蒼朮湯桃花丸

出保

命集

蒼朮

二防風
一兩

右剉細用水一椀煎一大盞絞清汁下桃花丸八十
丸立愈如小便澀少以五苓散下桃花丸或赤石脂
丸小便利則愈矣

瓜蒌散

出朱氏
集驗方

治五色痢疾久不愈者

瓜蒌

一箇黃色者以炭火炙存性
用碗蓋定地上一宿出火毒

右研為細末作一服用溫酒調服胡大卿有一僕人

患痢半年至杭州遇一道人傳此方而愈

堅腸丸

出楊氏
家藏方

治一切痢不問赤白膿血並主之

黃連

半兩
去鬚

龍骨

赤石脂

厚朴

薑汁塗各三錢
已上各二分

烏梅肉

一分

甘草

一分

阿膠

二錢
蛤粉炒

右件為末用湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服五十丸

空心米飲送下

天漿散

出楊氏家藏方

治下痢腹中痛膿血相雜

罌粟殼

五箇蜜炒

烏梅

半箇

甘草

半寸

乾薑

一塊煨

酸石榴皮

一小片

右作一服水二盞煎薑半溫服不拘時白痢不用甘

草赤痢不用乾薑赤白痢依此方服之

治酒痢 痢至骨立不食但飲酒有年矣與麝香一兩

止蓋麝能去酒毒

真人養臟湯

出百一選方

治一切痢

丁香

肉苳蔻

麵裹煨
去麴

木香

當歸

洗去
蘆

白茯苓

去黑
皮

罌粟

去蒂
炙

人參

去蘆各一
兩二錢半

甘草

一兩
炙

烏梅肉

一錢
半

酸石榴皮

陳皮

去
白

赤芍藥

黃連

去
鬚

白芍

藥

厚朴

去粗皮蘆
汁製炒

乾薑

炮
裂

阿膠

蛤粉
炒

地榆

訶

子

炮去核
七錢半

右礮粗末每服五錢水一盞半煎八分去滓通口服

食前兩服滓再作一服

神應丸

余居士
選奇方

治脾胃氣虛冷痛下痢不止

厚朴

汁三分

川當歸

四分

枳殼

礬

煨八分

乾薑

十分

縮砂

六分

赤石脂

五分

黃連

四分

龍骨

十分

附子

十分

去皮臍尖

訶子

七分

五味子

七分

茯苓

六分

人參

六分

右搗末醋醪九梧桐子大空心橘皮湯下三十九日

可三服凡食粘物及冷物酒麪則瀉痢往氣膨胸

膈滿悶微痛則瀉瀉或五更初則下泄且則有此狀

者並宜依此方服立效

止痢法

廣南四時攝生方

肉苳菹

一箇 訶子 二箇 炮

去核

不換金散

出十便 良方

治痢

新鑿粟殼

一兩白痢 灸赤劉蜜塗灸 赤赤白痢 半灸半蜜灸

甘草

一錢白痢 灸赤

痢生赤白痢

半灸半生

陳橘皮

半兩不去穢白痢 灸赤痢 焙赤白痢 半灸半焙

右為細末每服三錢用百沸湯調去滓熱服赤痢血

多用烏梅一箇入藥妙

治痢連萸丸

出十便 良方

黃連

吳茱萸

各二兩

右如常法揀洗焙乾黃連剉如寸斷同一處炒候香
熟分為三各用醋糊為丸梧桐子大若小兒則菴豆
大患赤痢則服黃連白痢服菴萸赤白則并服赤先
白後則先黃連而後菴萸赤多白少則三分黃連一
分菴萸反是亦如之每服五七十粒至百粒服之以愈
為度陳米飲下大率菴萸治白黃連治赤黃連用鷹
爪者

鹿角散

出十便
良方

治七八十老人患積痢不斷兼不能

飲食方

上黨人參

四分

鹿角

去上皮取白處作末炒令黃秤二分

右二味搗篩為散平旦粥清服方寸匕日再

觀音散

出十便良方

治男婦小兒痢

木香

一塊方一寸

黃連

半兩

右二味用水半升同煎乾去黃連只薄切末木香焙

乾為末三服第一橘皮湯下第二陳米飲下第三甘

草湯下此方徐君景純傳夫人患痢將死夢中觀音

受此方服之遂愈

治痢疾神效粟飲子

出華陀中藏經

丁香五枚 罌粟殼

五箇炙黃

甘草

一寸炙

肉苳蔻仁一枚 乳香

一皂子大

右咬咀以水一碗煎半碗溫服

治味除濕湯

出危氏方

治一身盡痛重著浮黃下痢如豆

汁

半夏麴

厚朴

去粗皮薑汁炒

蒼朮

各一兩炒

藿香葉

五錢

陳

皮

炒

茯苓

各五錢

粉草

五錢

官桂

木香

各三錢

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗二枚煎服空

心仍以五苓散兼服利其小水

頂禮散

出衛生寶鑑方

治陰陽相薄真氣失守上盛下寒便

痢不禁先宜固其腸胃

草果子

一分

白朮

白茯苓

半兩

訶子

一分

陳皮

一分

木香

一分濕

白扁豆

生薑自然汁煮去皮炒一分

瞿麥殼

蜜蘸慢火炙七次一

錢

半

右同為末每服五錢濃煎粟米飲一大盞同藥煎七分空心溫服

茱萸如聖丸

出衛生寶鑑

治脾寒臟寒腹疼腸滑下痢

吳茱萸

一兩去梗

黃連

七錢半微炒

罌粟殼

去蒂穰淨用一兩火炙

訶

子

去核半兩

川厚朴

去皮半兩薑製微炒

白芍藥

半兩

肉苳蔻

半兩用濕

紙裹火

煨熟

右為末醋糊為丸梧桐子大每服五十粒用米飲下如白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢甘草乾薑

湯下俱食前服

百歲丸

出衛生寶鑑

治一切惡痢雜下赤白及脾泄等痢

漏蘭子

一箇大者

阿膠

半兩

木香

半兩

黃連

半兩

罌粟

半兩

乳香

少許
別研

右除乳香外將其餘五味剉成小塊炒令焦黑色存性不令烟絕為末乳香和勻麵糊丸桐子大每服一歲一九因其年數服之不拘時候米飲下

神應丸

出衛生寶鑑

治禁口痢全不進飲食痢下不時

罌粟殼

半兩

乳香

四錢

木香

半兩

檳榔

五箇

肉苳蔻

一分

麵裹

煨

右為末煉蜜丸梧桐子大大人每服二十九小兒十

丸煎罌粟湯下

治中湯

出如宜方

治臟寒冷氣腹痛腸鳴下痢青黑

人參

乾薑

白朮

青皮

陳皮

甘草

各等分

右咬咀每四錢水煎服又服附子理中湯

對金散

出如宜方

治脾泄

陳皮

八兩

蒼朮

各二兩

厚朴

右為末薑棗煎加肉苳蔻

四神丸

出楊氏家藏方

治脾胃受濕腸虛下痢頻併不止

附子

炮去皮臍一兩

肉苳蔻

麵裹二兩煨香

訶子

煨去核半兩

乾薑

炮半兩

兩

右為細末蒸棗肉搜和丸梧桐子大每服五十九陳

米飲下

養臟湯

出續易簡方

治濕毒痢所下如豆羹汁心腹刺痛

腰腿沉重

厚朴

去皮乾製

肉苳蔻

麵裹煨

蒼朮

米泔浸剉炒

木香

橘紅

各二錢

赤茯苓

二錢半

甘草

炙一錢

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎八分

去滓食前溫服

萬應丸

出續易簡方

治久挾積滯因傷生冷遂作痢疾或赤

或白經久不瘥

白牽牛

肉苳蔻

麵裹煨

檳榔

各等分

右為末煉蜜丸如菉豆大每服五十九赤痢甘草湯
下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下空心食前
服

米粉丹

出同
前

治痢瘡及積痢

巴豆

去心皮
膜出油

粉霜

硃砂

硃砂

各一
錢

砒霜

研半
錢

右研勻黃蠟二錢溶成汁下藥攪勻菉豆大米飲下
一丸未瘥再進

育腸湯

出楊氏
家藏方

治脾胃虛冷或挾風冷臍腹撮痛下

痢虛滑或變膿血

人參

去蘆頭

白朮

高良薑

赤石脂

煨過

肉桂

去粗皮

當歸

洗焙

附子

炮去皮臍

甘草

炙

厚朴

去粗皮生薑汁浸炒

肉苳菹

麴

煨香

右各等分為粗末每服五錢水二盞入粳米二粒同煎一盞去滓溫服

治痢

欲投補藥必擇溫通之劑如四君理中須用木香白

荳蔻茯苓肉桂厚朴之類可以散風邪分水道開胃
脘治纏擾利閉澁此攻守之意兩全矣若虛損厥逆
六脉沉絕不可拘當重補兼助氣守而不攻可也宜
四順附子湯參附二建之類若厥而有痰所下或純
白黑凡薑附皆可用治痢當以開胃進食為急若行
止澁非惟養病必胃管閉而不通噤口不食急矣又
易簡斷下湯罌粟殼用醋炙加烏梅得法且有四君
料不致閉悶妨食本事用生薑炒

治患痢疾久後分寒熱急痛

出本章

以艾葉和蠟并訶子燒薰神驗

治患痢久後分急痛

出本章

以訶梨勒和臘燒薰及熱煎湯通手後洗

止下痢

出本章

以楓香水煎服

止痢

出本章

以楂子煨食之

治下痢後腸胃肥健人

出本草

以橡實殼為散及煮汁服之

止痢

出本草

以楓柳水煎服

止痢補中益氣堅筋骨通血脉起陽道

出本草

用陳廩米炊作乾飯食之

治痢後熱渴

出本草

以木槿作飲服之令人得睡

止痢及霍亂

出本草

以高良薑煮作飲服之

治痢

出本草

以桑葉炙令微乾和桑皮煎服

止痢治腹痛

出本草

以馬齒莧可細切煮粥食之

治大人小兒下痢

出同前

以烏賊魚骨炙令黃去皮細研成粉粥中調服食之

治暴痢後氣滿不能食

出同前

用赤小豆煮飯一頓服之即愈

治下痢臍下切痛

出本草

以狗肝一具洗細切米一升稀調煮粥空腹點三兩

合吃蒜椒葱鹽醋任性

止煩斷下痢平胃氣溫中長肌

出本草

用粳米飯及粥食之

止痢

出本草

以五月五日取鰾魚頭骨燒灰服之

治人取葛根誤得黃環吐痢不止

用土漿解之乃愈

氣痢

附論

夫氣痢者由表裏不足腸胃虛弱積痢之氣客於腸間
臟腑不和因虛則洩故為氣痢也 氣痢者由冷氣停

於腸胃間致冷熱不調脾胃不和腹脇虛滿腸鳴腹痛
便痢赤白名氣痢治法宜厚腸胃調冷熱補脾氣則痢

當自愈

方

人參湯

出聖濟
總錄

治氣痢并休息痢

人參

陳橘皮

湯浸去
白炒

黃連

去鬚
炒

赤茯苓

去黑
皮

檮

皮

地榆

當歸

切
焙

五味子

黃芩

去黑
心

白朮

炒

甘草

剉
炙

枳殼

去穰
麩炒

桂

去粗
皮

大腹子

剉各
一兩

右搗篩每服五錢水盞半薑一片棗大煎八分去滓

空心頓服

木香散

出聖濟總錄

治氣痢泄瀉心腹疔痛

木香

沉香

剉

桂

去粗皮

沒藥

各一分

胡椒

一分

當歸

切焙

一分 龍骨

半兩

乾薑

半兩

甘草

炙剉一分

附子

炮裂去皮

臍一分

肉苳

薏仁

一枚

赤石脂

半兩

蜜陀僧

一分

右搗羅為散每服一錢米飲調下食前服

烏梅丸

出同前

治氣痢不瘥疲劣變成冷瘕痢

烏梅肉

炒一兩

豬肝

一大葉以醋煮令爛研如糊

草苳

薏仁

草苳

去皮一兩

甘

草

炙剉一分

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩

訶梨勒皮

炒三分

肉苳

薏仁

去殼當歸切焙 乾薑炮 革撥 桂去粗皮

右搗羅十味為末用猪肝煎九梧桐子大每服二十

丸米飲下陳麴湯下亦得

蒼朮丸

出聖濟總錄

治氣痢瘦弱諸藥不效者

蒼朮

厚朴

去粗皮生薑汁炙

黃連

去積當歸

焙乾各一兩半

龍骨

一兩

艾葉

炒三分

訶梨勒皮

炒一兩半

吳茱萸

湯洗炒十一兩

乾薑

炮

兩附子

炮裂去皮臍一兩

右為末米飲和衆手九桐子大每服三十九食前生

薑湯下

地榆散

出聖濟總錄

治氣痢腹脇虛滿腸鳴腹痛便下赤白

地榆

檮皮

當歸

切焙

黃連

去鬚炒

枳殼

去穰麩炒

桔梗

桂

去粗皮

陳橘皮

湯浸去白炒

大腹

剉去皮

甘草

炙剉各一兩

右搗篩每服五錢水盞半薑一棗大煎八分去滓空

心服

葶撥丸

出同前

治脾胃虛冷蕪腸間冷瀉變成氣痢

葶撥

一兩一分

檳榔

剉一兩一分

附子

炮去皮臍各一兩一分

阿魏

三兩

以水四合煎五
六沸同蜜和藥
訶梨勒皮
蕪荑仁
白朮

各二兩

黃連

去鬚各
三兩

枳殼

去穰麩炒
一兩三分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九空心生薑湯

下日再漸加至四十丸

陳橘皮丸

出聖濟
總錄

治氣痢年深不瘥

陳橘皮

湯浸去白
焙一兩

白茯苓

去黑皮
三分

陟釐

微炒
半兩

麥蘖

炒熟
三分

白石脂

一兩

赤白石脂

三分

無食子

三枚炒
令烟出

龍骨

一兩

酸石榴皮

炙黃
一兩

右為末麵糊丸梧桐子大每服二十五丸空心以溫

漿水下日午再服

赤石脂散

出聖濟
總錄

治氣痢不止氣力困弱

赤石脂

三分

乾薑

炮三分

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩

龍骨

三分

黃連

去鬚一兩

三分

白茯苓

去黑皮三分

無食子

三枚炒令烟出

當歸

切焙三分

右為散每服三錢空心米飲下日晚再服

地榆湯

出同前

治脾毒氣痢下血如鷺鴨肝腹痛不止

地榆

訶梨皮

各一兩

甘草

炙

當歸

切焙各半兩

栝葉

茜根 芍藥 赤茯苓

去黑皮
各三分

右剉細每服三錢水一盞煎取六分去滓溫服食前

木香丸

出同
前

治氣瀉不止

木香

丁香

縮砂仁

肉苳蔻

去殼各
一兩

藿香葉

赤石脂

訶梨勒皮

各半
兩

右為末用麴糊丸梧桐子大空心食前米飲下十五

丸

龍骨散

出聖濟
總錄

治氣痢腹內虛鳴日久不瘥

龍骨 黃連

去鬚

黃蘗

去粗皮

乾薑

炮

阿膠

人參

厚朴

生薑汁炙去粗皮各二兩

右為散每服二錢空心米飲下日再

橘皮丸

陳橘皮

湯浸去白焙三兩

乾薑

木香

枳殼

去穰麩炒

芍藥

各三兩 桂

去粗皮

大黃

各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九空腹煎生薑

湯下日再

硝砂蜜丸

出聖濟
總錄

治氣痢胃大腸虛不能制晝夜無度

漸令人黃瘦食不為肌肉困重無力眼目多溢十年
不愈

硝砂蜜

去皮
一兩

肉苳蔻

半兩
去殼

黃連

去鬚
二兩

當歸

切
焙

赤石

脂 陳橘皮

去白酒浸一宿
炒乾各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心溫
漿水下日晚再服老人娠婦並可服

溫中散

出聖
惠方

治氣痢腹內疼痛不欲食

白朮

三分

白芍藥

半兩

甘草

一分炙微赤剉

當歸

半兩剉微炒

吳茱

萸

一分湯浸七遍焙乾微炒

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎六分去滓不拘時稍熱服

木香散

出同前

治氣痢腹內疼痛四肢不和少欲飲食

木香

三分

紅苳蔻

一兩去皮

乾薑

半兩炮裂剉

當歸

三分剉微炒

赤

石脂

一兩

訶梨勒

一兩煨用皮

用細羅為散每服不拘時以粥飲調下二錢

訶梨勒散

出聖
惠方

治氣痢心腹痛不欲飲食

訶梨勒

一兩煨
用皮

當歸

三分剉
微炒

紅荳蔻

三分
去皮

木香

半兩

龍骨

三兩

右搗細羅為散每服不計時以粥飲調下二錢

白朮丸

出同
前

治氣痢心腹疼痛

白朮

三分

枳殼

半兩麩炒
微黃去穰

黃連

半兩去
鬚微炒

當歸

三分剉
微炒

蕪荑仁

二兩
微炒

右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九不拘

時粥飲下

木香丸

出同前

治久氣痢不瘥腹內冷痛

木香

半兩

白礬

二兩燒令汁盡

黃丹

一兩微炒

礪砂

一兩

龍骨

一兩

右搗羅為末用軟飯和丸梧桐子大每服十九不拘

時粥飲下

黃連丸

出聖濟總錄

治久氣痢不止或劇

黃連

去鬚微炒

當歸

切焙

烏梅肉

微炒乾

訶梨勒

炮去核各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心薑製

過厚朴煎湯下日再服

桃仁丸

出同前

治氣痢久不瘥

安息香

半兩別研入

桃仁

去皮尖雙仁炒香一分別研入

木香

半兩

訶梨

勒

炮去核一兩

右將木香訶梨勒為末與二味研了藥相和重細研入少許米飲丸梧桐子大每服三十九空心用煖漿水下日晚再服

神驗丸

治冷癆氣痢腹脇疼痛水穀不消

陳翹

炒

吳茱萸

湯浸焙乾
炒各一兩

黃連

去鬚
炒

蕪荑

炒各
三分

右為末蘆汁和丸桐子大每服十五丸溫米飲食前

服

木香丸

出聖濟
總錄

治諸氣痢不止

木香

肉苳蔻仁

碯砂仁

赤石脂

各半
兩

右為末以棗肉和丸梧桐子大每服二十九丸溫米飲

下食前服之

木香碯砂散

出同
前

治氣痢腹脹中虛鳴

木香

二兩半

硝砂仁

一兩半

枳殼

去穰
麩炒

訶梨勒皮

各三兩

右為細末每服一錢空心以陳米飲調下良久以食

壓之

枳殼丸

出聖
惠方

治氣痢久不止

枳殼

一兩麩炒
微黃去穰

黃連

去鬚炒
一兩

蕪荑仁

一兩
微炒

右搗羅為末軟飯和丸桐子大每服食前以米飲下

三十丸

木香丸

出聖濟
總錄

治氣痢久不止

木香

一兩

訶梨勒

炮去核
二兩

右為末用粥飲丸桐子大每服二十九空心溫漿水

下日午再服

香艾丸

出同
前

治氣痢腹痛睡不安

艾葉

炒

陳橘皮

湯浸去白
焙各等分

右為末酒煮爛飯丸梧桐子大每服二十九空心鹽

湯下

治氣痢久不止

出聖
惠方

用寒食一百五日預採木蓼曝乾用時搗羅為末食
前粥飲調下一錢

牛乳香

一名葦撥煎
出聖濟總錄

治氣痢衆醫不效久不愈諸痢

困弱者

以牛乳汁煎葦撥服立愈唐貞觀中太宗苦於氣痢
詔問左右有能治其疾者重賞忽有術士張寶藏進
此方時賞官三品一方牛乳半斤葦撥末二錢同煎
減半空心服

巴石丸

出肘後方

治氣痢

以白礬飛令霜白謂之巴石以熟猪肝作丸空心米飲下數丸隨人力氣加減若得水牛肝更好素食人饑餅丸之亦通或云白礬中青黑者名巴石一方白礬不拘多少用炭火於淨地上燒令汁盡便其色如雪名之巴石一兩研

治氣痢

用巴豆一兩去皮心熬細研取熟猪肝和丸空心米

飲下量力加減服之牛肝尤佳如食素人以饊餅丸服

治脾毒氣痢下血如鷺鴨肝腹痛不止

出聖濟總錄

取胡黃連末用鷄子白調作餅子炙令黃研為末入樗皮汁和再作餅用蜜塗炙黃不拘多少搗為散米

飲調下二錢

肉苳菟散

出聖濟錄

治氣痢腹脹不下食

方見本門瀉泄類

治氣痢裏急後重神驗方

以宣連一兩乾薑半兩各為末每用連二錢薑半錢
和勻空心溫酒下

治氣痢長服方

以訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩搥篩蜜丸梧桐子
大每服二三十丸米飲送下

水穀痢

附論

夫水穀痢者由體虛腠理開血氣虛春傷於風邪氣留
連在肌肉之內後遇脾胃大腸虛弱而邪氣乘之故為

水穀痢也脾與胃為表裏胃者脾之腑也為水谷之海
脾者胃之臟也其候身之肌肉而脾氣主消水穀水穀
消其精化為榮衛以養臟腑充實肌膚大腸肺之腑也
為傳道之官化物出焉水穀之精化為血氣者行於經
脉其糟粕行於大腸也肺與大腸為表裏而肺主氣其
候身之皮毛春陽氣雖在表而血氣尚弱其飲食居處
運動勞役血氣虛者則為風邪所傷客於肌肉之間後
因脾胃氣虛風邪又乘虛而進入於腸胃其脾氣弱者

不能尅制水穀故糟粕不結聚而變為痢也又新食竟取風名為胃氣其狀惡風頭多汗膈下塞不通飲食不下腹脹形瘦腹大食物則脹滿食寒則洞泄洞泄者痢無度也若胃氣竭者痢絕即死診其脉小手足寒難療脉大手足溫易療也下白沫脉沉則生浮則死身不熱脉不懸絕滑大者生懸濇者死以藏期之也脉絕而手足寒晡時脉還手足溫者生脉不還者死脉緩時小結者生洪大數者死懸絕而澁者死細微而濇者生緊大

而滑者死得大絕脉者不死

方

廣濟療赤白水穀冷熱等痢

地榆

六分

白朮

五分

厚朴

六分

乾薑

六分

熟艾

四分

赤石脂

七分
研

龍骨

七分

甘草

四分

黃連

十分

烏梅

六分
熬

人參

六分

當歸

五分

右為末蜜丸桐子大米飲汁服三十九日三服加至

三十九忌海藻菰菜肉生冷等

厚朴散

出聖惠方

治水穀痢腹內疼痛兩脇虛脹不思飲

食

厚朴

一兩去粗皮塗生薑汁炙令熟

木香

半兩

人參

去蘆頭半兩

訶梨勒

三分煨用皮

乾薑

半兩炮裂剉

陳橘皮

一兩浸去白焙

當歸

半兩剉炒

地

榆

三分剉

附子

一兩炮去皮臍

右為散每服三錢水一中盞煎五分去滓不拘時稍

熱服

藍青丸

治中焦熱水穀下痢

藍青升汁三 黃連兩八 黃蘗兩四 阿膠兩五 白朮 地榆

地膚子 烏梅肉熟各三兩

右為散用藍汁和微火上煎取可為丸如杏子清白飲進二丸亦不得停留忌猪肉冷水菹李雀肉等

訶梨勒丸 治水穀痢腹脇虛脹時復疼痛不欲飲食

訶梨勒一兩煨用皮 乾薑三分炮剉 當歸一兩剉炒 黃連去鬚微炒 白

朮一兩 木香三分 厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙香熟

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不

拘時粥飲下三十丸

龍骨丸 治水穀痢日夜數腹內疼痛

龍骨三分艾葉一分

微炒

赤石脂三分

白礬一分

全汁盡

黃連三分

去鬚
微炒

當歸三分

微炒

附子一分

去皮臍

右為末煉蜜和搗三二百杵丸桐子大每於食前以

粥飲下三十丸

瀉心湯 治老小下痢水穀不分腸中雷鳴心下痞滿

乾嘔不安

人參 黃芩

甘草

各一兩

乾薑

一兩半

黃連

二兩

半夏

三兩 大棗 十二枚

右咬咀以水八升煮二升半分三服并治霍亂若寒加附子一枚渴加栝蒌一枚二兩嘔加橘皮一兩痛加當歸一兩渴熱以生薑代乾薑

胃風湯

治胸結下痢風冷水穀不化

方見本門諸泄痢類

肉苳菟散

治水穀痢心腹脹滿不能飲食

肉苳菟

一兩去殼

木香

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

乾薑

一兩炮裂剉

厚

朴

一兩去皮塗生薑汁炙香熟

右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎六分不拘

時稍熱服

附子五味散 穀痢久候痢無期度食不消化腹痛每

遇冷便發有此疾候者

附子

炮

細辛

白朮

各五兩

乾薑

四兩

神麴

一升熱

右為散以飲下之初服一方寸匕日再服稍加至二

三匕良忌猪肉冷生桃李雀肉等

草苳薏散 治水穀痢不止腹內疼痛

草苳薏

一兩 去皮

白石脂

一兩

當歸

一兩 剉 微炒

乾薑

一兩 炮剉

右羅為散每服不計時以粥飲調下二錢

四白丸 治水穀痢臍腹疼痛日夜數行

白石脂

二兩

白礬

一兩 燒灰

白龍骨

二兩

胡粉

二兩 炒黃

右研為末用粳米飯和搗一二百杵丸如梧桐子大
每服食前粥飲下三十丸

療水穀痢方

乾薑

分三鷄子

枚二小豆

二百粒炒
令香中食

黃連

分二

右搗篩三物內鷄子黃白中攪勻微火上炒令可丸
一服五十九如小豆大旦以飲服即瘥忌食脂膩生
冷猪魚蒜葱

療熱水穀下痢方

黃連

阿膠

兩各二

梔子

枚二十

右切以水七升煮二升分為三服忌猪肉冷水

馬蘭散

出聖
惠方

治水穀痢日夜百度及水痢百起

馬蘭子

一兩
微炒

乾薑

一兩
炮剉

黃連

一兩
去鬚
剉微炒

右為散不拘時以粥飲調下二錢一方熟煮湯取一合許和二方寸匕入腹即斷冷熱皆治常服神効不得輕之忌猪肉冷水

又方

橡斗

五枚
威莨菪
子炒令黑

龍骨

半兩
柿蒂
七枚

右羅為散不拘時以粥飲下一錢

神妙橡實散 治水穀痢無問老小日夜百餘行

橡實

二兩

乾楮葉

一兩炙

右羅為散每服不計時煎烏梅湯調下一錢

菖蒲九

治水穀痢及冷氣腹痛虛鳴

菖蒲

三兩

乾薑

一兩半炮剉

右羅為散用粳米飯和丸梧桐子大每服食前粥飲

下三十丸

又方

龍骨

末三兩

巴豆

二七枚去心皮研壓出油

右以粟米稠粥和九麻子大每服以陳米粥下三九如微轉以井花水下

荳蔻散

治水穀痢久不止腹脇脹悶不思飲食

方見本門

諸痢類

治水穀痢久不止

以胡粉二兩棗肉和搗作餅子急火中燒令赤即出地上以碗合之勿令風入待冷細研食前粥飲調下半錢

治水穀痢

出肘後方

用韭作羹微炒任食之

又方

用小豆一合和蠟三兩頓服愈

療水穀痢方

用椶櫚皮燒灰研以水和服三方寸匕

廣濟療水痢及霍亂冷痢及食不化有白膿日夜無節度但疑是冷悉主之兼治瀉痢

白石脂 乾薑

各八兩

右為末以沸湯和少許麵薄糊和藥并手捻作丸如常法下不止加乾薑八兩忌如常法一方米飲空心下霍亂吐瀉漿水下

療水痢腹中氣方

茯苓

八分

白龍骨

八分 研

訶梨勒

八分

黃連

八分

酸石榴皮

八分

右為末蜜丸梧桐子大空心以飲服每服二十九日

二服止忌肉油膩生冷等

療水穀痢方

狗骨灰

牛骨灰亦得

麴

六月六日造熟令黃

右等分為散空腹飲服一方寸匕無六月六日麴即常麴亦得

主水痢方

鷄子

二枚

黃蠟

一兩

右熬熟食之宜空肚食之日三服佳

又方 主水痢及療熱水穀下痢

黃連 蒼朮

各三兩

右作散和鷄子七枚同煮并捻作丸煮赤豆作漿粥服下三十九日三服若渴但飲豆漿粥一方以水七升煮二升分服忌猪肉冷水

黃芩五味散 水穀之候必腹甚痛食無妨但食後即痢食皆化盡唯變作水痢無期度多食多下少食少下有此狀者宜服

黃芩

黃連

黃蘗

各五兩

黃耆

四兩

龍骨

六兩

右為散以飲下之初服一方寸匕日二稍加至二三匕服瘥乃止忌猪肉冷水等

治水穀痢

黃連

二兩

黃蘗

二兩

阿膠

二兩炙

右為散以苦酒蜜各半升煎阿膠令洋入內諸藥令可丸飲服三九日四

白蒿方

治夏日暴水痢

用白蒿葉乾為末以米和一匙空腹服之

療水穀下痢方

用黃連一升金色者打碎陳米五合二物以水七升煮二升分為二服

安石榴湯 療水痢及赤白痢篤困欲死腸已滑醫不能療者

乾薑

黃蘗

各二兩

石榴

一枚殼小者二枚

阿膠

二兩半炙切

右以水三升煮一升二合去滓內膠令鎔頓服即瘥

更治老小亦良羸瘦者稍服一方無黃蘗用黃連

治水穀痢 所下之痢並無赤色只下黃沫忽時下白沫飲食減少肌體黃瘦宜服此方

訶子

麴炮去核用皮

舶上黃

研細各一兩

黃橘皮 白朮

川芎

各半兩

甘草

炮四兩

肉苳蔻

一箇

右件細杵羅為末用舶上黃末相滾令均用薏苡仁杵作粉煮粥丸如梧桐子大急焙乾每服五十九空心米湯下須是焙乾莫令損藥氣

治水穀痢久不瘥

厚朴

三兩

黃連

三兩

右剉以水三升煎取一升空心服

蠱痢

附論

凡下痢膿血間雜瘀黑有片如鷄鴨肝與血皆下者蠱痢也此由歲時寒暑不調濕毒之氣襲人經脉漸至臟腑毒氣挾熱與血相搏客於腸間如病蠱注之狀故名蠱痢也

方

療三十歲以下痢及霍亂諸藥不能療并腸滑若是蠱

注所中

蓼子

艾屑

各二升

龍膽

續斷

白朮

各三兩

蜀椒

去目汗

附子

炮

桂心

苦參

乾薑

甘草

炙

鼠尾

草

各二兩

右搗篩蜜和丸如梧桐子大一歲兒服一九三歲兒服二九五歲兒服三九大人服五九飯下療寒熱氣喘

塌在胸中卒氣痛繞臍忌桃李雀肉生葱猪肉冷水

海藻菰菜

蛭皮丸 治臟腑傷動腸胃虛弱血滲腸間風冷相乘

大便下血瘀黑有片或五痔腫痛久下膿血者

蛭皮

一具切炙令黑

當歸

剉焙

續斷

黃耆

連翹

槐寔

炒乾薑

炮

附子

炮去皮臍

白礬

飛各五兩

生乾地黄

五兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸空心食

前米飲下

地榆散 治蟲注痢下血如鷺鴨肝腹痛不止

地榆

判一兩

甘草

半兩炙微赤判

赤芍藥

一兩

栝葉

微炙

茜根

判一兩

當歸

一兩判微炒

訶梨勒

一兩煨用皮

黃連

一兩去鬚微炒

右為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓不計時

溫服

地榆湯

治蟲痢下血如鷺鴨肝片腹痛煩悶

一名犀角散

地榆

判

犀角

銔

黃連

去鬚微炒

栝葉

微炒

當歸

判微炒

黃蘗

去粗皮炙判

黃芩

去黑心

生乾地黃

焙

赤地利

各半兩

右搗篩每服三錢以水一盞煎七分去滓溫服不計時粥飲調亦得

黃芩散 治蠱注痢下血心中煩悶腹中疔痛

黃芩

一兩 地榆

一兩

犀角屑

一兩 茜根

一兩 栢葉

二兩 甘

微炒

草

一兩 訶梨勒

一兩 煨

牛角鰓灰

一兩 當歸

一兩 微

剉

微

炒

右為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓不計時

溫服

茵根飲 治蠱痢下血如鷄鴨肝腹中痞痛難忍心中

煩悶不欲飲食

一名升麻散

茵根

升麻

犀角

鎊

桔梗

去蘆頭劉炒

黃芩

去黑心

黃

藥

去粗皮各三分

地榆

白蘘荷

各一兩用根

右為粗散每服五錢水一盞半煎七分去滓日午空

心服一方酒調服

茵根丸

治毒痢及蠱注下血如豚肝心煩腹痛又脉

或大或小浮陷而起下血如豚肝五内切痛此因服

五石湯丸逼損陰氣甚則其血自百脉經絡而來注
下成蠱毒此為難治

茜根

洗

川升麻

去蘆

犀角

鎔

地榆

洗

黃連

去鬚

當歸

去蘆

洗

枳殼

去穰
麩炒

白芍藥

右等分為末醋糊丸梧桐子大每服五十九空心米
飲下

茜根散

治蠱注下血如鷄肝體熱心腹中煩悶

茜根

一兩
剉

川升麻

一兩

犀角屑

一兩

地榆

一兩
剉

黃連

一兩

去翳
微炒
黃芩
一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓不拘時

溫服

升麻湯 治蠱痢下血片臍下疔刺痛

升麻 地榆 茜根 黃芩
去黑心各一兩半 犀角 鎊一兩

山梔子
半兩

右搗篩每服五錢水一盞半入生地黃一升切薤白三莖切豉三十粒同煎八分去滓空心溫服日晚再

煎服

治中蠱下痢日數十行

巴豆

十四枚去
皮心出油

藜蘆

去蘆
頭

芫青

去翅
足炒

附子

炮去
皮臍

白

礬

熬枯各
半兩

右為末和勻以綿裹藥一大豆許內下部日三

治蠱注痢血如鷄肝者心神煩躁宜服

犀角屑

一兩

地榆

三分
剉

蘘荷根

一兩

馬兜鈴根

一兩

右為散每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫

服

玉連丸 治脾積下痢蠱痢同

木香

訶子

連核各半兩

黃連

一斤炒紫色

右為細末研粳米飲糊丸桐子大每服一百丸空心食前米飲下日進一服

黃蘗丸 治歲時蠱痢

黃蘗

去粗皮

黃連

去鬚各一兩

右為末飯飲為丸桐子大每服二十九空心米飲下

日午再服

黃芩湯

治蠱毒痢如鷺鴨肝腹痛不可忍

黃芩

去黑心

黃連

去鬚各半兩炒

右細剉以水二盞煎一盞去滓空心日晚乘熱服冷即凝

黃連散

治痔漏蠱毒下痢

黃連

去鬚一兩

白礬

燒令汁盡

乾薑

炮

附子

炮裂去皮臍各三分

右為細散每服一錢半溫酒調下空心日午服方寸

已不止更服之日三

桔梗散

出聖濟總錄

治蠱痢下血如鷄肝疼痛

桔梗

去蘆頭剉炒

犀角

鎊各等分

右為散酒服一錢日三不能自服者即灌之藥下心
中煩須臾自靜七日廼止可食豬脾以補養之

治蠱注下血如鷄肝體熱心腹中煩悶

出聖惠方

黑豆

合一毛桃膠

半兩

右以水一大盞煎六分去滓食前分溫二服

治蠱注熱毒痢血或如小豆汁腹痛煩悶

出聖惠方

用扁竹葉一兩剉以水一大盞煎六分去滓入吳鹽汁二合更煎三五沸食前分溫二次服

治腸蠱先下赤後下白黃沫連年不瘥兼治痢下先白

後赤若先赤後白為腸蠱

出聖惠方

用牛膝一兩切槌碎以醇酒一升漬一宿平旦空心服之再服愈

羚羊角散

一名黃連丸
出危氏方

治下血黑如鷄肝色相似時

發渴者


方見本門
熱痢類

治男子婦人小兒大腸下血黑茶脚色或膿血如靛色

所謂蠱痢者也治之有殊效又能殺五臟蠱

出圓經

取側柏葉焙乾為末與川廣黃連二味為汁服



普濟方卷二百十